

Catégorisation des personnes à vacciner contre la COVID-19 pour les phases restantes du déploiement de la stratégie de vaccination

Les maladies concernées par les différents degrés de vulnérabilité sont reprises en détail dans le tableau suivant :

Phase 2	
2a	Personnes hautement vulnérables en raison de leur âge
	Personnes à partir de l'âge de 75 ans, en commençant par les plus âgées
2b	Personnes hautement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant
	Trisomie 21, adultes
	Greffe d'organe solide, y compris personnes inscrits sur une liste d'attente
	Greffe de cellules souches hématopoïétiques, au cours des 6 premiers mois ou sous traitement immunosuppresseur
	Cancer et hémopathie maligne sous traitement (chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie)
	Déficits immunitaires congénitaux

Phase 3

3a Personnes significativement vulnérables en raison de leur âge

Personnes de 70 à 74 ans, en commençant par les plus âgées

3b Personnes significativement vulnérables en raison d'un état de santé préexistant

Immunodéficience acquise

médicamenteuse : immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie au long cours à dose immunosuppressive

infection à VIH avec des CD4 <200/mm³

asplénie, fonctionnelle ou non

Affection respiratoire chronique sévère

Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère, stade GOLD 3 et 4, groupe D*

Mucoviscidose

Fibrose pulmonaire chronique sévère

Pathologie restrictive extrapulmonaire sévère sous assistance ventilatoire ou non

Asthme sévère non contrôlé (niveau 5 selon GINA)[§] corticodépendant (sous corticothérapie orale)

Maladie cardiovasculaire sévère :

insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV[#]

coronaropathie instable

cardiomyopathie

Déficit neuro-cognitif majeur (score MMS[°] ≤ 20)

Insuffisance rénale chronique dialysée

Cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh

Obésité morbide (indice de masse corporelle ≥ 40 kg/m²)

Phase 4

4a Personnes modérément vulnérables en raison de leur âge

Personnes de 65 à 69 ans (en commençant par les plus âgées)

4b Personnes modérément vulnérables en raison d'un état de santé préexistant

Diabète avec ou sans insuline, avec complications cardio-neuro-vasculaires

Hypertension artérielle compliquée, avec séquelle d'accident vasculaire cérébral ou cardiopathie associée

Maladie neuromusculaire avec répercussions cliniques

Phase 5

5a Personnes âgées de 55 à 64 ans, en commençant par les plus âgées

5b Personnes qui présentent un état de santé qui peut les exposer à un risque majoré

Diabète équilibré, sans complication

Hypertension artérielle non compliquée

Obésité (indice de masse corporelle 30-40 kg/m²)

Phase 6

6a Catégories spécifiques de la population générale

Personnes précaires, vivant en collectivités, et non vaccinées antérieurement du fait de leur vulnérabilité

Autres personnes particulièrement exposées à l'infection du fait de leur activité

6b Population résidente générale

Population résidente générale de 16 à 54 ans, en commençant par les plus âgés, non vaccinée antérieurement du fait d'une vulnérabilité